

SISTEMA DE PROTECCIÓN DE INSECTOS EN LAS FAS



ADVERTENCIA
El lavado en seco elimina la permetrina del uniforme.

Instituto de Medicina Preventiva de la Defensa



BIHANGA

ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN

PARENTERAL

Para su prevención se recomienda a nivel individual::

- Utilizar sistemáticamente guantes en la atención a heridos o accidentados.
- Lavarse las manos con agua y jabón al prestar este tipo de auxilio
- Lavar los ojos con abundante agua y/o suero salino en caso de que se produzcan salpicaduras de sangre o secreciones en los párpados, y ojos.

En Centros Sanitarios:

En general lo más recomendable es utilizar servicios sanitarios de Fuerzas Armadas de otros países occidentales, o los que recomiende el personal sanitario de Fuerzas Armadas occidentales con presencia permanente en los países.

- Utilizar centros sanitarios locales únicamente en caso de extrema necesidad.
- Se realizarán transfusiones, intervenciones quirúrgicas, suturas y administración de

inyecciones fuera del Buque o de la Base, únicamente en los casos en que sea estrictamente necesario.

- En esos casos utilizar los centros sanitarios recomendados por el Servicio de Sanidad del Buque o de la Base.

ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL (INCLUYENDO VIH/SIDA)

La prevención de estas graves enfermedades se basa en informar y promover actitudes prudentes, preferiblemente de **abstinencia sexual**.

Utilizar siempre **preservativos**.

Prevalencia de VIH/SIDA en Militares nigerianos, 1998 - 1999



Fuente: Adedokun A. 3rd AF African Congress of Armed Forces and Public Medical Services, 1999, Pretoria.

RIESGO DE INFECCIÓN POR PERSONAS NATIVAS CON LAS QUE SE CONVIVE: ALUMNOS, SUBORDINADOS, AUTORIDADES, TRABAJADORES EN COCINAS, ETC.

En el África subsahariana en general, se recomienda:

- Los manipuladores de alimentos deben ser sometidos a estudio de heces (Huevos y parásitos) en el momento de ser admitidos y luego con una periodicidad trimestral.
- Los alumnos y subordinados se les debe realizar una radiografía de tórax en el momento del ingreso para detectar posibles casos de tuberculosis pulmonar.
- Si el contacto va ser muy estrecho (actividades de lucha personal, actividades deportivas de contacto (lucha, fútbol, etc.) se harán test de VIH/SIDA, Hepatitis B y Hepatitis C.

Con frecuencia se produce el fallecimiento de alguno de estos alumnos, trabajadores, colaboradores, etc.

La causa de la muerte no llega a conocerse y, en el contexto epidemiológico, caracterizado por brotes de Ébola y Marburg, alta prevalencia de Tuberculosis, VIH/SIDA, etc., se hace patente el riesgo sanitario que corren los efectivos allí desplegados.

Será preciso dedicar todos los esfuerzos necesarios, para garantizar la protección de la salud de estos efectivos.

El mando debe tomar conciencia de esta necesidad y facilitar la acción coordinada de los organismos correspondientes: Centro de Intendencia, UALSAN, IMPDEF, Estados Mayores de cada Ejército, y de la Defensa, etc.